



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
EBSERH – HOSPITAL DE CLÍNICAS - GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU

Edital nº 57/2017 – Prova Teórica – 02/11/2017

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
-----------	-------	-------------------

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	ORDEM
-------------------------------------------------------------	-------

201 – Atenção Hospitalar - Enfermagem

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não será permitido ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados **OBRIGATORIAMENTE** dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 3.6.5 do Edital.
 - h) Empréstimo de materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.
9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Conteúdo Geral

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

✕

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

CONTEÚDO GERAL

01 - No âmbito de atuação do SUS, é correto afirmar que compete à Vigilância Epidemiológica:

- a) a participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- b) a participação, normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
- c) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- d) a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- ▶ e) a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.

02 - No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), considere os seguintes itens:

1. **Formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos.**
2. **Fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.**
3. **Fiscalização do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.**
4. **Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.**

O SUS é responsável pelas ações:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- ▶ d) 1, 2 e 4 apenas.
- e) 1, 3 e 4 apenas.

03 - Na implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas no SUS, qual atividade desenvolvida pela equipe de saúde tem o objetivo de realizar uma revisão do diagnóstico com nova avaliação de riscos e redefinição das linhas de intervenção?

- ▶ a) Projeto Terapêutico Singular.
- b) Autocuidado.
- c) Cuidado Continuado/Atenção Programada.
- d) Atenção Multiprofissional.
- e) Apoio Matricial.

04 - Qual dos princípios e diretrizes do SUS, descritos na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, representa a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços entre vários grupos de governo?

- a) Universalização do direito à saúde.
- ▶ b) Descentralização com direção única para o sistema.
- c) Integralidade da atenção à saúde.
- d) Participação popular visando o controle social.
- e) Resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

05 - A elevação do número de casos de uma doença ou agravamento, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada, é chamada de:

- a) surto.
- ▶ b) epidemia.
- c) pandemia.
- d) endemia.
- e) peste.

06 - Em relação aos objetivos da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde, considere as seguintes ações:

1. **Ampliar o acesso e qualificar atendimento às pessoas com deficiência no SUS, com foco na organização de rede e na atenção integral à saúde, que contemple as áreas de deficiência auditiva, física, visual, intelectual e ostomias.**
2. **Ampliar a integração e articulação dos serviços de reabilitação com a rede de atenção primária e outros pontos de atenção especializada.**
3. **Desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.**
4. **Organizar os Serviços de Atenção Domiciliar no âmbito do SUS.**

São objetivos da Rede:

- a) 1 e 4 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- ▶ d) 1, 2 e 3 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

07 - A equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família é composta pelos seguintes profissionais:

- a) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de psicologia e terapia ocupacional.
- b) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico.
- ▶ c) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.
- d) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico.
- e) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.

08 - Nas doenças crônicas, o conceito de autocuidado na promoção e prevenção da saúde significa:

- ▶ a) colaboração estreita entre a equipe de saúde e os usuários, os quais trabalham em conjunto para definir o problema, estabelecer as metas, monitorá-las, instituir os planos de cuidado e resolver os problemas que apareçam ao longo do processo de manejo.
- b) recomendações específicas para cada nível de atenção, elaboradas com o objetivo de orientar o cuidado, a partir da compreensão ampliada do processo saúde-doença.
- c) classificação dos usuários de determinado serviço de acordo com a gravidade da enfermidade e definição de uma série de ofertas que serão programadas de acordo com o nível em que se encontra o usuário.
- d) realização da aprendizagem por problemas, significativa e organizada em pequenos grupos, sempre tendo como referência e ponto de partida as questões do mundo do trabalho que incidem sobre a produção do cuidado.
- e) determinação de fluxos assistenciais que devem ser garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde.

09 - Qual ferramenta utilizada pela equipe de Saúde da Família tem como objetivo compreender melhor o funcionamento da família estudando as suas relações de poder, comunicação e afeto?

- a) Entrevista familiar.
- b) Genograma.
- c) Ecomapa.
- d) P.R.A.C.T.I.C.E.
- ▶ e) F.I.R.O.

10 - Considere os seguintes objetivos:

1. Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde e contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
2. Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas.
3. Organizar a atenção às urgências de modo que atendam à demanda espontânea e/ou referenciada e funcionem como retaguarda para os outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade.
4. Garantir retaguarda de atendimentos de média e alta complexidade, procedimentos diagnósticos e leitos clínicos, cirúrgicos, de cuidados prolongados e de terapia intensiva para a Rede de Atenção às Urgências.

São objetivos da Atenção Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências e Emergências:

- a) 1 e 3 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- ▶ c) 3 e 4 apenas.
- d) 1, 2 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**11 - Quando a quimioterapia antineoplásica é realizada previamente ao tratamento principal com a finalidade de redução do volume tumoral e eliminação de metástases, é denominada:**

- a) potencializadora.
- ▶ b) neoadjuvante.
- c) paliativa.
- d) adjuvante.
- e) de estadiamento.

***12 - O transplante de medula óssea consiste na substituição da medula óssea doente ou suprimida por medula óssea normal infundida através da via venosa. Nesses casos, a assistência de enfermagem requer profissionais especializados e aptos para avaliar, prever complicações, cuidar e orientar. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:**

1. A trombocitopenia é uma das complicações e expõe o paciente a hemorragias.
2. A doença do enxerto contra o hospedeiro tem como alvos principais a pele, os rins e o trato gastrointestinal.
3. A irradiação e filtragem de hemocomponentes visam à prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional.
4. A mucosite é a complicação mais comum e debilitante, expondo o paciente a infecções.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

13 - A radioterapia consiste no uso de radiação ionizante com finalidade terapêutica, determinando a morte de células malignas e/ou impedindo sua multiplicação. A assistência de enfermagem inclui cuidados para minimizar os efeitos colaterais locais e/ou sistêmicos dessa modalidade de tratamento. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Lavar a pele do campo de tratamento com água morna e sabonete neutro está indicado e contribui para prevenir reações na pele.
- () A área de tratamento deve ser protegida da exposição solar de seis a 12 meses após o tratamento.
- () O uso de loções e cremes da escolha do paciente é recomendado.
- () Diabéticos estão mais propensos a infecção secundária no campo de tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – F – V – V.
- d) V – V – F – F.
- e) F – V – V – V.

14 - A agulha do tipo *huber point* é usada no tratamento quimioterápico, possui bisel lateralizado, apresentação curva ou reta, com ou sem extensão. Esse instrumento é indicado para punção:

- a) intra-arterial.
- b) intratecal.
- ▶ c) da câmara de cateter totalmente implantado.
- d) intraperitoneal.
- e) intrapleurar.

15 - O exame físico é parte fundamental do cuidado de enfermagem pediátrico, com vistas à prevenção e detecção precoce de distúrbios de saúde. A hiperextensão da cabeça, com dor à flexão, é um sinal de alerta indicativo de:

- a) lesão ao músculo esternomastóideo.
- ▶ b) irritação meníngea.
- c) ambliopia.
- d) hipocalcemia.
- e) síndrome de Cushing.

16 - A respeito de situações testemunhadas ou suspeitas de aspiração de corpo estranho por crianças, considere as seguintes condições:

1. A criança é incapaz de emitir som.
2. A tosse é ineficaz.
3. Há dificuldade respiratória progressiva.
4. Os sons respiratórios apresentam estridor.

A tentativa de desobstrução das vias aéreas é recomendada nas condições:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 1 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- ▶ e) 1, 2, 3 e 4.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão.

17 - A vacinação está associada à prevenção primária, faz parte das políticas públicas no Brasil e deve ser considerada nas ações de prevenção secundária em pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Para se vacinarem, pacientes em uso de antiagregantes plaquetários (ácido acetilsalicílico, por exemplo) não necessitam suspender essa medicação ou mudar a via de administração da vacina.
2. As principais vacinas destinadas a cardiopatas são aquelas contra infecções respiratórias.
3. Pacientes em uso de doses elevadas de imunossupressores deverão ter a vacinação adiada.
4. A vacina pneumocócica não reduz a mortalidade de portadores de DCNT.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

18 - As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, fazendo com que a observação dos fatores de risco associados e a redução da mortalidade alcançada por programas de prevenção cardiovascular levassem a Organização Mundial da Saúde a estabelecer ações para a redução desses agravos à saúde. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes ações:

- () Reduzir o conteúdo de sal dos alimentos.
 () Aumentar impostos e preços sobre os produtos originados do tabaco.
 () Restringir a venda de álcool no varejo.
 () Substituir gorduras trans em alimentos por gorduras poli-insaturadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- ▶ c) V – V – V – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – F – F – V.

19 - A obesidade é um problema de saúde pública no mundo e crescente no Brasil. Esse agravo está associado com hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes mellitus, entre outras enfermidades. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A obesidade é definida quando o índice de massa corpórea for maior ou igual a 30 kg/m² em adultos.
 () Adultos com índice de massa corpórea maior ou igual a 35 kg/m² são considerados na condição de obesidade grau III.
 () Adultos com índice de massa corpórea maior a 30 kg/m² com comorbidades e que não responderam a outras modalidades de tratamento podem ser candidatos à cirurgia para a redução de peso.
 () Índice de massa corpórea maior que 40 kg/m² é condição para avaliação de cirurgia para a redução de peso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – F – F – V.
- b) V – V – V – F.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – V – F.
- e) F – F – F – V.

20 - O enfermeiro, ao realizar pesquisas com seres humanos, deve observar as normas nacionais, incluindo a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da pesquisa. Esse termo visa atender ao princípio ético da:

- a) não maleficência.
- b) justiça.
- c) equidade.
- ▶ d) autonomia.
- e) beneficência.

21 - Conflitos éticos ocorrem em diversos cenários da assistência em saúde. Esses conflitos envolvem os profissionais, os pacientes, as famílias e a sociedade. Considerando que o tratamento quimioterápico causa efeitos colaterais severos, porém contribui para a cura do câncer ou para paliar sintomas dele decorrentes, observa-se, nesse contexto o envolvimento do princípio ético da:

- a) equidade.
- b) responsabilização.
- c) autonomia.
- d) justiça.
- ▶ e) beneficência.

22 - De acordo com o Decreto nº 94.406/87, que dispõe sobre o exercício da enfermagem no Brasil, incumbe privativamente ao enfermeiro:

- a) elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- b) execução de programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco.
- ▶ c) execução de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- d) elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem.
- e) desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras com vistas a atender às necessidades de saúde da população.

23 - A influenza sazonal consiste em infecção viral aguda do sistema respiratório, alta transmissibilidade e distribuição global. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A transmissão é dependente da carga viral e se dá habitualmente de forma direta, mas há evidências de transmissão indireta do vírus.
- () Precauções-padrão e precauções com gotículas devem ser empregadas para conter a transmissão/contágio.
- () A vacinação é contraindicada para menores de 6 meses de idade.
- () Não há comprovação de que a vacina influenza seja isenta de risco de causar a doença.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – V – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – V – F.
- d) V – F – V – V.
- e) F – F – F – V.

24 - Presbiopia, nictúria e tempo de reação lentificado são condições fisiológicas que reduzem a segurança, quando da hospitalização, do seguinte grupo de pessoas:

- a) dependentes químicos em abstinência.
- b) gestantes.
- c) pacientes em pós-operatório imediato.
- ▶ d) idosos.
- e) pacientes vítimas de acidente vascular encefálico.

25 - Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e sofrem variações que devem ser conhecidas pelo enfermeiro para a adequada avaliação. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A temperatura corporal pode sofrer alterações de acordo com o ritmo circadiano.
- () Níveis reduzidos de hemoglobina aumentam a frequência respiratória.
- () A posição supina reduz a frequência do pulso.
- () A pressão arterial volta aos níveis basais entre 15 a 30 minutos após a pessoa parar de fumar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- ▶ c) V – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – V.

26 - O erro de medicação pode determinar uso inapropriado do fármaco e causar danos ao indivíduo. Várias são as estratégias para promover o uso seguro de medicamentos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. O direito de recusar-se a executar prescrição em caso de identificação de erro de registro ou ilegitimidade está amparado legalmente no Brasil.
2. Em situações de emergência, é facultada a prescrição verbal.
3. A expressão “uso contínuo”, sem prazo para reavaliação, pode ser utilizada, exclusivamente, para prescrições ambulatoriais.
4. O uso da expressão “se necessário” na prescrição deve ter, minimamente, as seguintes informações adicionais: dose, posologia e dose máxima diária.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

27 - A saturação de oxigênio no sangue pode ser medida indiretamente por meio de oxímetro de pulso, e sua leitura pode ser afetada por diversos fatores. Para alguns fatores não existem evidências científicas que os comprovem como intervenientes, permanecendo como mitos. Assinale a alternativa que apresenta um desses mitos.

- a) Movimentação do paciente.
- b) Fontes externas de luz.
- ▶ c) Hipertensão arterial.
- d) Corantes intravasculares.
- e) Icterícia.

28 - Os desequilíbrios acidobásicos são, temporariamente, compensados pelos rins e sistema respiratório, mas exigem a pronta intervenção. A análise crítica de fatores de risco, sinais, sintomas e achados laboratoriais no sangue contribui para o adequado diagnóstico e intervenções de enfermagem. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Estado hipermetabólico associado a diminuição do nível de consciência, aumento da frequência e profundidade respiratória e pH sanguíneo superior a 7,35 pode indicar acidose metabólica.
- () História de DPOC e sinais de confusão mental, pele quente e ruborizada, acompanhados de pH sanguíneo inferior a 7,35 podem indicar acidose metabólica.
- () Transfusão sanguínea maciça, seguida de parestesia de extremidade das mãos, arritmias cardíacas e pH sanguíneo inferior a 7,45, pode indicar alcalose metabólica.
- () A dor aguda, associada ao aumento da frequência e profundidade respiratória, com pH sanguíneo superior a 7,45, pode indicar alcalose respiratória.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F.
- b) F – V – V – V.
- c) F – V – F – F.
- d) V – F – V – F.
- ▶ e) F – F – F – V.

29 - A dor nociceptiva decorre de quatro processos fisiológicos sequenciais (transdução, transmissão, percepção e modulação), mediados por neurotransmissores e neuromoduladores. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A substância P é necessária à transmissão dos impulsos dolorosos da periferia para os centros superiores do encéfalo.
- () A serotonina contribui para a transmissão da dor.
- () A histamina está relacionada ao aumento da permeabilidade capilar.
- () Os neuromoduladores inibitórios estão localizados no encéfalo, medula espinhal e trato gastrointestinal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F.
- ▶ b) V – F – V – V.
- c) V – F – F – F.
- d) F – V – F – V.
- e) F – V – V – F.

30 - Ao admitir um paciente com história de dor e uso de opioides há dois dias, o enfermeiro deve estar atento aos possíveis efeitos colaterais do tratamento farmacológico. Assinale a alternativa que identifica um desses efeitos.

- ▶ a) Constipação.
- b) Dependência física.
- c) Taquicardia.
- d) Incontinência urinária.
- e) Parestesia em extremidades.

31 - Ao admitir um paciente para cirurgia eletiva, o enfermeiro verifica a ausência do termo de consentimento cirúrgico. O procedimento adequado a ser adotado nesse caso é:

- a) encaminhar o paciente de volta à unidade de internação.
- b) solicitar ao enfermeiro supervisor para providenciar o termo.
- c) encaminhar o paciente para a sala cirúrgica e registrar a ocorrência.
- d) solicitar que o paciente assine o termo.
- ▶ e) solicitar ao cirurgião para providenciar o termo.

32 - A participação da família na recuperação do paciente cirúrgico é fundamental. Ao orientar a família para estimular a deambulação assistida para idoso submetido à cirurgia urológica, o enfermeiro objetiva prevenir prioritariamente:

- a) a infecção cirúrgica.
- b) a infecção do trato urinário.
- c) a lesão por pressão.
- ▶ d) o tromboembolismo venoso.
- e) a queda.

- 33 - Adequado posicionamento e alinhamento corporal contribui para prevenir sequelas decorrentes, por exemplo, de queda plantar, hiperextensão de articulações e pontos de pressão. A colocação de um rolo de trocanter é uma estratégia usada na enfermagem para:**
- manter o alinhamento adequado da cabeça.
 - ▶ manter a patela direcionada para cima.
 - evitar a dorsiflexão da mão.
 - reduzir o risco de queda plantar.
 - evitar a rotação interna dos ombros.
- 34 - A análise dos resultados da urinálise contribui para a detecção de determinadas condições patológicas em sistemas corporais. A presença de mais de 8 mg de proteínas/100 mL de urina:**
- indica incapacidade dos túbulos renais para reabsorver a proteína.
 - decorre da quebra de ácidos graxos.
 - ▶ resulta de danos a glomérulos ou túbulos renais.
 - indica redução do fluxo sanguíneo renal.
 - decorre de incompetência funcional.
- 35 - Pacientes adultos ou pediátricos com estado crítico de saúde demandam seguro acesso venoso central para a administração de medicamentos, hemotransfusão, nutrição parenteral e reposição eletrolítica, entre outros procedimentos. O tipo de cateter que apresenta maior relação custo-benefício e menores riscos, dispensa a utilização de sala cirúrgica e exige apenas raios X simples para a confirmação de sua localização após ser inserido é o cateter:**
- ▶ venoso central de inserção periférica de longa permanência.
 - venoso central totalmente implantado de longa permanência.
 - venoso central semi-implantado de longa permanência.
 - de Swan-Ganz.
 - de Hickman.
- 36 - Visando a segurança ambiental e do trabalhador de saúde, cuidados especiais devem ser adotados com quimioterápicos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:**
- Os resíduos de quimioterapia devem ser encaminhados para o processo de incineração.
 - Equipos, algodão, gaze e frascos vazios ou com resíduos de quimioterápicos devem ser desprezados em um recipiente rígido e impermeável, identificado corretamente com a simbologia padronizada que identifica o resíduo tóxico.
 - Em situações de acidentes pessoais com quimioterápico, o vestuário deve ser removido imediatamente quando houver contaminação; as áreas de pele atingidas devem ser lavadas com água e sabão neutro e as mucosas irrigadas com água ou solução isotônica.
 - Nas áreas de preparação, armazenamento e administração e para o transporte, deve ser mantido um “kit” de derramamento identificado e disponível, contendo, no mínimo: luvas de procedimento, avental impermeável, compressas, proteção respiratória e ocular, sabão, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**
- V – V – F – V.
 - F – F – V – F.
 - ▶ V – F – V – V.
 - F – V – F – V.
 - F – V – V – F.
- 37 - A transfusão do componente sanguíneo necessário ao paciente, e não de sangue total, é um preceito racional da hemoterapia moderna. Conforme estabelecido pela Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, o planejamento da infusão de concentrado de hemácias em paciente pediátrico deve ser de:**
- 5 a 15 mL/kg/hora.
 - ▶ 20 a 30 mL/kg/hora.
 - 25 a 45 mL/kg/hora.
 - 40 a 60 mL/kg/hora.
 - 45 a 65 mL/kg/hora.
- 38 - A situação epidemiológica da dengue nos últimos 10 anos no Brasil permanece caracterizada pelo crescente número de casos graves e óbitos. Em dengue grave e na eventualidade de parada cardiorrespiratória durante a gravidez com mais de 20 semanas de idade gestacional, a reanimação cardiopulmonar deve ser realizada considerando-se cuidado adicional com objetivo específico de:**
- hemotransfusão para compensar a hipoperfusão de órgãos.
 - realização de cesárea, em caso de ausência de reversão da parada, com vistas à sobrevivência do feto.
 - indução ao parto após estabilização da gestante, com vistas à sobrevivência da mãe.
 - ▶ deslocamento do útero para a esquerda, para descompressão da veia cava inferior durante a reanimação.
 - notificação do caso para elaboração de indicadores de letalidade da dengue em gestantes.

- 39 - A hepatite viral B consiste em problema de saúde pública no Brasil e no mundo; é uma doença de transmissão parenteral. São líquidos orgânicos que podem conter o vírus e representar fontes de infecção:**
- a) sêmen, secreção vaginal e urina.
 - b) saliva e leite materno.
 - c) secreções mucosas e urina.
 - d) sangue, urina, secreção vaginal e sêmen.
 - ▶ e) sêmen, secreção vaginal e leite materno.
- 40 - A hemorragia pode representar complicação gestacional, sendo mais frequentemente relacionada a descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia, que correspondem a até 50% dos diagnósticos. É importante conhecer os fatores relacionados para traçar o plano de acompanhamento de enfermagem à gestante. Para placenta prévia, o principal fator de risco é:**
- ▶ a) cesariana prévia.
 - b) uso de drogas.
 - c) idade materna avançada.
 - d) trauma abdominal.
 - e) rotura prematura de membranas ovulares.
- 41 - O tétano acidental é uma toxoinfecção grave cuja atenção de saúde deve estar direcionada à principal manifestação clínica que corresponde a:**
- a) necrose tecidual.
 - ▶ b) rigidez muscular progressiva.
 - c) convulsão.
 - d) hipertermia.
 - e) alteração do nível de consciência.
- 42 - No Brasil a alta prevalência de cesarianas onera o serviço público e expõe, muitas vezes desnecessariamente, o binômio mãe-filho a risco evitável. O adágio “uma vez cesárea sempre cesárea” resulta do medo de rotura uterina durante o trabalho de parto em mulher com história de cesariana:**
- ▶ a) clássica com cicatriz uterina em T invertido.
 - b) de emergência.
 - c) há mais de 24 meses.
 - d) por eclampsia.
 - e) segmentar.
- 43 - No Brasil, o câncer de colo uterino é o quarto mais frequente. Attingir alta cobertura no rastreamento da população definida como alvo é o componente mais importante para redução da incidência e da mortalidade desse agravo à saúde. Considerando esse assunto, ao realizar a consulta de enfermagem com uma adolescente de 16 anos com ausência de história de atividade sexual e queixa de corrimento vaginal, cabe ao enfermeiro adequada avaliação de coleta de exame citopatológico. No caso descrito:**
- a) há recomendações conflitantes quanto à coleta de material endocervical em presença de corrimento vaginal.
 - b) o exame citopatológico deve ser coletado pelo enfermeiro e, se normal, repetido anualmente.
 - c) o exame citopatológico deve ser coletado pelo enfermeiro e recoletado a cada três anos se os dois primeiros exames anuais forem normais.
 - d) dois exames citopatológicos devem ser coletados com intervalo de um a três anos; após, anualmente, se os resultados forem normais.
 - ▶ e) não há indicação para rastreamento do câncer de colo do útero e seus precursores nesse grupo de mulheres.
- 44 - O diabetes mellitus do tipo 2 manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar do agravo. Porém, com a epidemia de obesidade, observa-se aumento de sua incidência em crianças e adolescentes. Compete ao enfermeiro realizar consulta de enfermagem a esses grupos, abordar e estratificar riscos, orientar mudanças no estilo de vida e aplicar tecnologias e recursos diagnósticos. Recomenda-se a estratificação de riscos cardiovasculares com aplicação da Escala de:**
- a) Aldrete-Kroulik.
 - b) Bristol.
 - ▶ c) Framingham.
 - d) Neecham.
 - e) Oucher.
- 45 - Toda mulher com diabetes em idade fértil deve receber orientações sobre planejamento da gravidez, em face da possibilidade de:**
- a) gestação molar.
 - b) coagulopatia.
 - c) gestação prolongada.
 - ▶ d) alto risco gestacional.
 - e) parto prematuro.

- 46 - A parada cardiorrespiratória é um evento crítico que exige pronta ação para o restabelecimento das condições mínimas para a vida. Em vítima fora do ambiente de saúde e atendida apenas por um socorrista, o padrão específico de reanimação é um mínimo de:**
- ▶ a) 100 compressões torácicas por minuto, forte, sem parar.
 - b) 2 ventilações a cada 15 compressões torácicas.
 - c) 80 compressões torácicas por minuto, forte, sem parar.
 - d) 100 compressões a cada intervalo, para a verificação da sua eficácia.
 - e) 2 ventilações a cada 20 compressões torácicas.
- 47 - Considera-se que todos os pacientes atendidos em serviços de saúde têm risco para quedas. O Ministério da Saúde recomenda a avaliação do risco à admissão e diariamente para todos os pacientes. Ao avaliar um paciente recém-admitido no serviço de emergência, a enfermeira o classifica como de baixo risco para queda e orienta medidas preventivas. São condições para essa classificação, paciente:**
- a) acomodado em maca e sem fator de risco específico para quedas.
 - ▶ b) acamado, restrito ao leito, totalmente dependente da ajuda de terceiros.
 - c) independente e com fator de risco para queda.
 - d) acomodado e se locomovendo em cadeira de rodas.
 - e) realizando as atividades e se locomovendo sem auxílio de terceiros, com história prévia de queda.
- 48 - O aleitamento materno é reconhecido como positivo ao desenvolvimento infantil e imunológico, à relação mãe-filho e à prevenção de obesidade infantil, entre outros benefícios, devendo ser fortemente estimulado. Porém, em algumas situações, como o uso de cocaína e crack pela mãe, o profissional de saúde deve considerar a segurança do lactente e indicar:**
- a) interrupção do aleitamento por uma hora, por dose.
 - b) suspensão da amamentação somente quando a mãe for soropositiva para HIV.
 - ▶ c) interrupção da amamentação por 24 horas, após o consumo de cocaína ou crack.
 - d) suspensão da amamentação nos casos de drogadição grave.
 - e) substituição da amamentação independentemente da droga consumida ou frequência de uso.
- 49 - A consulta de enfermagem para pessoas com hipertensão arterial sistêmica tem o objetivo de educar, avaliar e estratificar o risco, monitorar os níveis pressóricos e contribuir para o controle de fatores de risco, inclusive os relativos ao estilo de vida. Ao identificar situação de cefaleia, dispneia, déficit neurológico, dor precordial e alterações visuais, o enfermeiro deve:**
- a) diagnosticar o caso como provável infarto agudo do miocárdio e solicitar eletrocardiograma.
 - b) realizar duas medidas de pressão arterial com intervalo de 24 horas.
 - c) reorientar medidas para o controle pressórico e incluir o paciente na visita domiciliar.
 - d) agendar consulta médica para iniciar tratamento farmacológico.
 - ▶ e) encaminhar o paciente para atendimento médico imediato.
- 50 - A higienização é medida básica de uso no cotidiano assistencial para a segurança do paciente e do profissional da saúde. Quantas são as oportunidades que englobam a assistência e que determinam a obrigatoriedade da higienização das mãos estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde?**
- a) 2.
 - b) 3.
 - c) 4.
 - ▶ d) 5.
 - e) 6.